

C-mond Capsule

Composition:

Each capsule contains: vitamin C (Ascorbic Acid) 500 mg.

Excipients:

Modified cellulose (vegetarian capsule).

Indications:

- Ascorbic acid deficiency.
- Anti-oxidant and to support the immune system.
- Scurvy: Prevention of scurvy.

Contraindications:

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
Ascorbic acid should not be given to patients with hyperoxaluria.

Adverse Reactions:

1% to 10%: Endocrine & metabolic: Hyperoxaluria (with large doses).
<1%: Diarrhea, dizziness, fatigue, flank pain, flushing, headache, heartburn, nausea, vomiting.

Pregnancy Considerations:

Some pregnant women (eg, smokers) may require supplementation greater than the Recommended Dietary Allowance.

Drug interactions:

Aluminum Hydroxide: Administering the two agents at least 2 hours apart may help minimize the interaction.
Bortezomib: Ascorbic Acid may diminish the therapeutic effect of Bortezomib. Management: Patients should avoid taking vitamin C supplements and vitamin C-containing multivitamins during their bortezomib therapy.
Copper: May decrease the serum concentration of Ascorbic Acid.
Cyclosporine (Systemic): Ascorbic Acid may decrease the serum concentration of Cyclosporine (Systemic).
Deferoxamine: Ascorbic Acid may enhance the adverse/toxic effect of Deferoxamine.
Estrogen Derivatives: Ascorbic Acid may increase their serum concentration.

Drug administration and dosage:

Take one capsule once daily preferably without food or as directed by your doctor.

Storage Conditions:

Keep C-mond at room temperature (between 15 °C and 30 °C).

Package:

30 capsules in carton package.

Rev. No.

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria

سي-موند كيسول

التركيب:

كل كيسولة تحتوي على: فيتامين سي (حمض الأسكوربيك) ٥٠٠ ملغ.
السواغات: سيلروز معدل (كيسولات نباتية).

الاستخدامات:

- عزز فيتامين C.
- مضاد أكسدة و داعم لجهاز المناعة.
- داء اسقربوط: للوقاية من داء اسقربوط.

مضادات الاستخدام:

فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من السواغات.
لا ينبغي إعطاء حمض الأسكوربيك لمرضى فرط أوكسالات البول.

التأثيرات الجانبية:

١-١٪: تأثيرات ذات صلة بالاستقلاب والغد الصماء: ارتفاع اوكسالات البول (عند استخدام جرعات عالية).
>١٪: إسهال، دوام، تعب، ألم خاصرة، توجع الوجه، صداع، حرق، غثيان وإقياء.

الحمل والإرضاع:

احتياطات بحالة الحمل:
تحتاج بعض الأمهات الحوامل (مثل: المتخذات) إلى جرعات أعلى من الجرعة الموصى بها يومياً.

التداخلات الدوائية:

هيدروكلوريد الألمنيوم: يُفضل المباشرة بين مواعيد تناول هذين الدوائين بحوالي ساعتين للتقليل من التداخل.
يورتيزوميب: قد ينقص الإغناء الممتاز من لهذين الدوائين من فعالية اليورتيزوميب.
نحاس: ممكن أن يُنقص النحاس من امتصاص حمض الأسكوربيك.
سيكلوسبورين (جهازِي): قد يُنقص حمض الأسكوربيك من التراكيز المصلية للسيكلوسبورين.
ديفيروكسامين: قد يحسن حمض الأسكوربيك من التأثيرات الجانبية للديفيروكسامين.
مشتقات الإستروجين: قد يزيد حمض الأسكوربيك من التراكيز المصلية لمشتقات الإستروجين.

طريقة الإعطاء:

تُعطى كيسولة واحدة مرة يومياً، ويفضل تناولها دون طعام أو بحسب إرشادات الطبيب.

شروط الحفظ والتخزين:

يُحفظ C-موند بدرجة حرارة الغرفة (١٥°C - ٣٠°C).

التعبئة وشكل العبوة:

عبوة كرتونية تحوي ٣٠ كيسولة.

اتحاد الصيادلة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما — ريف دمشق — سوريا