

# Cedrimond Film Coated Tablets

## COMPOSITION:

Each film coated tablet contains: Acetaminophen 250 mg, Aspirin 250 mg, Caffeine 65 mg.

**Excipients:** Microcrystalline cellulose, Povidone, Stearic acid, Crospovidone and opadry.

## PROPERTIES:

Cedrimond is a combination of analgesic and antipyretic works by blocking substances that cause pain and inflammation.

## INDICATIONS:

Temporarily relieves minor aches and pains due to:

- Headache (migraine).
- Arthritis.
- Sinusitis.
- Premenstrual & menstrual cramps.
- Cold.
- Muscular aches.
- Toothache.

## WARNINGS:

- **Reye's syndrome:** Children and teenagers who have or are recovering from chicken pox or flu-like symptoms should not use this product. When using this product, if changes in behavior with nausea and vomiting occur, it could be an early sign of Reye's syndrome, a rare but serious illness.

- **Allergy alert:** Aspirin may cause a severe allergic reaction which may include:

- Hives.
- Asthma (wheezing).
- Facial swelling.
- Shock.

- **Liver warning:** This product contains acetaminophen. Severe liver damage may occur if the patient takes:

- More than 8 tablets in 24 hours, which is the maximum daily amount.
- With other drugs containing acetaminophen.
- 3 or more alcoholic drinks every day while using this product.

- **Stomach bleeding warning:** This product contains a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), which may cause stomach bleeding. The chance is higher if:

- The patient's age 60 or older.
- The patient has stomach ulcers or bleeding problems.
- The patient takes an anticoagulant or steroid drug.
- The patient takes other drugs containing an NSAID (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others).
- The patient has 3 or more alcoholic drinks every day while using this product.
- The patient takes more or for a longer time than directed.

- **Caffeine warning:** The recommended dose of this product contains about as much caffeine as a cup of coffee. The use of caffeine-containing medications or foods while taking this product should be limited because too much caffeine may cause nervousness, irritability, sleeplessness, and, occasionally, rapid heartbeat.

- **The patient should consult the doctor if:**

- 1- The patient has high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, kidney disease or stroke.
- 2- The patient is taking a diuretic or has asthma.
- 3- The patient is taking a drug for diabetes, gout, or arthritis.

- **Patient should stop use the drug and ask a doctor if:**

- Pain gets worse or lasts for more than 10 days.
- Fever gets worse or lasts for more than 3 days.
- Any new symptoms appear.

- Cedrimond may reduce the number of platelets. Patient should avoid activities that may cause bruising or injury. Patient should tell the doctor if he has unusual bruising or bleeding.

- Patient should ask a doctor before he receives any medical or dental care, emergency care, or surgery.

- Cedrimond may cause false results with some in-home test kits for blood cholesterol.

- Use Cedrimond with caution in the ELDERLY; they may be more sensitive to its effects.

## CONTRAINDICATION:

- 1- If patient has an allergic reaction to any ingredient in the drug.
- 2- With any other drug containing acetaminophen (prescription or nonprescription) or the patient is taking another NSAID.
- 3- If the patient has had severe allergic reaction to aspirin, tartrazine or NSAID.
- 4- If the child or teenager has flu or chickenpox.
- 5- If the patient has bleeding problems (hemophilia, low blood platelets).

## SIDE EFFECTS:

### Common side effects

Heartburn; nausea; upset stomach.

### Severe side effects

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue); confusion; fainting; hearing loss; ringing in the ears; symptoms of liver problems (eg, dark urine, pale stools, persistent loss of appetite, right-upper stomach pain, yellowing of the skin or eyes); unusual tiredness.

## Drug interaction

- Carbonic anhydrase inhibitors (eg, acetazolamide): May they may decrease acetaminophen/aspirin/caffeine's effectiveness.

- With anticoagulants (eg, warfarin), clopidogrel, corticosteroids (eg, prednisone), heparin, ketorolac, NSAIDs (eg, celecoxib, ibuprofen, naproxen), or serotonin reuptake inhibitors (eg, fluoxetine): The risk of bleeding may be increased.

- Insulin, isoniazid, oral hypoglycemics (eg, glyburide, repaglinide), or quinolone antibiotics (eg, ciprofloxacin): The risk of their side effects may be increased by acetaminophen/aspirin/caffeine.

- Methotrexate, theophylline, or valproic acid: Their actions and the risk of their side effects may be increased by acetaminophen/aspirin/caffeine.

- Probenecid or sulfapyrazone: Their effectiveness may be decreased by acetaminophen/aspirin/caffeine.

## PREGNANCY AND BREAST-FEEDING:

The use of aspirin during the last 3 months of pregnancy is not recommended, it may cause injury to the fetus or complications during delivery.

Cedrimond is found in breast milk, the patient should discuss with the doctor about the possible risk to the baby if the patient is breastfeeding or will be.

## OVERDOSE:

In case of overdose, quick medical attention is critical for adults as well as for children even if the patient don't notice any signs or symptoms.

## DOSAGE AND ADMINISTRATION:

- Adults and children 12 years and over: 2 tablets every 6 hours; not more than 8 tablets in 24 hours.
- Children under 12 years: according to doctor prescription.
- Patient should not take more than the prescribed dose.
- The dose should be taken with a full glass of water.

## STORAGE:

Store at temperature (20° - 25°C).

Keep out of reach of children.

## PACKAGE:

20 film coated tablets in PVDC / Alu blisters in carton package.

Rev. No: 21707

THIS IS A MEDICAMENT	
-	The medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.
-	Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
-	Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
-	Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENT OUT OF THE REACH OF CHILDREN	

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

**DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria**

# سيدري موند مضغوطات ملبسة بالفيلم

## التركيب:

كل مضغوظة ملبسة بالفيلم تحوي: أسيتامينوفين ٢٥٠ ملغ، أسبيرين ٢٥٠ ملغ، كافئين ٦٥ ملغ.  
السواغات: ميكروكريستاللين سيللوز، بوفيدون، حمض الشمع، كروس بوفيدون، أوبادراي.

## الخصائص:

سيدري موند هو عبارة عن مشاركة بين مسكن ألم وخافض للحرارة يعمل عن طريق إحصار المواد التي تسبب الألم والالتهاب.

## الاستطبيات:

يفرج بشكل مؤقت الأوجاع الخفيفة والألام الناجمة عن:

- الصداع (الشقيقة).
- الزكام.
- التهاب المفاصل.
- الآلام العضلية.
- التهاب الجيوب.
- آلام الأسنان.
- المنص الحيضي والسابق للحيض.

## التحذيرات:

- متلازمة راي: لا يجوز استخدام هذا المستحضر من قبل الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الحماق أو الأعراض الشبيهة بالانفلونزا أو الأطفال الذين تم تشخيصهم من هذه الأعراض. إذا حدث أي تغير في السلوك مترافقاً مع غثيان أو إقياء عند استخدام هذا المستحضر فإن هذه الأعراض ممكن أن تكون إشارة باكراً لمتلازمة راي وهو مرض نادر ولكنه خطير.

- التحذيرات المتعلقة بالحساسية: ممكن أن يسبب الأسبيرين تفاعلات تحسسية شديدة قد تتضمن:

- الشرى.
- تورم الوجه.
- الربو (الأزيز).
- الصدمة.

- التحذيرات المتعلقة بالكبد: يحتوي هذا المستحضر على الأسيتامينوفين. ممكن أن يحدث ضرر كبدي شديد إذا تناول المريض:

- أكثر من ٨ مضغوظات في ٢٤ ساعة، وهي الجرعة اليومية العظمى.
- أدوية أخرى تحوي الأسيتامينوفين.

• الكحول بمعدل ثلاث مرات أو أكثر يومياً أثناء فترة استخدام هذا المستحضر.

- التحذيرات المتعلقة بالنزف المعدي: إن هذا المستحضر يحتوي على مضاد التهاب لا ستيرويدي الذي يمكن أن يسبب نزف معدي. إن فرصة حدوث نزف معدي تكون عالية في حال:

- عمر المريض ٦٠ سنة أو أكثر.
- يعاني المريض من قرحة معديّة أو نزف معدي.
- تناول المريض مضادات التخثر أو دواء ستيرويدي.
- تناول المريض أدوية أخرى تحتوي على مضادات التهاب لا ستيرويدي (أسبيرين، إيبوبروفين، نابروكسين وغيرها).
- تناول المريض الكحول بمعدل ثلاث مرات أو أكثر كل يوم أثناء استخدام هذا المستحضر.
- تناول المريض الدواء بجرعة أكبر أو لمدة أطول من الموصوف.

- التحذيرات المتعلقة بالكافئين: إن الجرعة الموصى بها لهذا المستحضر تحتوي من الكافئين مايعادل محتوى كوب واحد من القهوة. يجب الحد من استخدام الأدوية والأطعمة الحاوية على الكافئين أثناء تناول هذا المستحضر لأن الإكثار من تناول الكافئين ممكن أن يسبب عصبية وهياج وأرق وأحياناً تسرع في ضربات القلب.

- يجب على المريض استشارة الطبيب إذا:

- ١- كان لدى المريض ارتفاع في ضغط الدم أو مرض قلبي أو تشمع كبد أو مرض كلوي، أو صدمة.
- ٢- كان المريض يتناول مدر بولي، أو يعاني من الربو.
- ٣- كان المريض يتناول أدوية لداء السكري أو النقرس أو التهاب المفاصل.

- يجب على المريض إيقاف استخدام الدواء واستشارة الطبيب في حال:

- ازدياد الألم سواء أو استمراره لأكثر من ١٠ أيام.
- ازدياد الحمى سوءاً أو استمرارها لأكثر من ٣ أيام.
- ظهور أي عرض جديد.

- قد يخفف سيدري موند من عدد الصفيفحات الدموية، على المريض أن يتجنب الأنشطة التي قد تسبب كدمات وإصابات، على المريض أن يخبر الطبيب إذا كان لديه كدمات غير اعتيادية أو نزيف.

- يجب على المريض استشارة الطبيب قبل الحصول على أي رعاية طبية أو سنية، الرعاية في حالات الطوارئ، أو الجراحة.

- سيدري موند قد يسبب نتائج خاطئة مع بعض مجموعات الاختبارات المنزلية لاختبار الكوليسترول في الدم.

- يستخدم سيدري موند بحذر لدى المسنين، لأنهم قد يكونون أكثر حساسية لتأثيراته

## مضادات الاستطباب:

١- إذا كان لدى المريض رد فعل تحسسي تجاه أحد مكونات الدواء.

٢- مع أي أدوية أخرى تحوي أسيتامينوفين (بوصفة أو بدون وصفة) أو إذا كان المريض يتناول مضاد التهاب غير ستيرويدي آخر.

٣- إذا كان لدى المريض رد فعل تحسسي شديد للأسبيرين، تارتازازين أو مضادات التهاب غير ستيرويدي.

٤- إذا كان لدى الطفل أو المراهق انفلونزا أو جدري الماء.

٥- إذا كان لدى المريض مشاكل نزف (التعاور، وانخفاض الصفيفحات الدموية).

## التأثيرات الجانبية:

### الآثار الجانبية الشائعة:

حرقة؛ غثيان؛ اضطراب في المعدة.

### الآثار الجانبية الشديدة:

تفاعلات تحسسية شديدة (طفح؛ شرى؛ حكة؛ صعوبة في التنفس؛ ضيق في الصدر؛ تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان)؛ ارتباك؛ اغماء؛ فقدان السمع؛ طنين في الأذنين. أعراض مشاكل في الكبد (مثل، بول داكن، براز شاحب، فقدان الشهية المستمر، آلام في الشق الأيمن العلوي للمعدة، اصفرار الجلد أو العينين)؛ تعب غير اعتيادي.

### التداخلات الدوائية:

- مبيطات الأهدراز الكربونية (مثل، أسيتازولاميد)؛ قد تقلل من فعالية الأسيتامينوفين / الأسبيرين / الكافئين.

- مع مضادات التخثر (مثل الوارفارين)، كلويدوغريل، الستيرويدات القشرية (مثل بريدنيزون)، هيبارين، كيتورولاك، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل، سيليكوكسيب، إيبوبروفين، نابروكسين)، أو مبيطات إعادة قبط السيروتونين (مثل، فلوكسيتين)؛ قد تزيد من خطر النزيف.

- الأنسولين، أيزونازيد، خافضات السكر القموية (مثل، غليبوريد، ريباغليدين)، أو المضادات الحيوية الكينولونية (مثل، سيبروفلوكساسين)؛ خطر تأثيراتها الجانبية يمكن أن تزيد بسبب الأسيتامينوفين / الأسبيرين / الكافئين.

- الميتوثريكسات، النيوفين، أو حمض الفالبارويك؛ تأثيرهم وخطر تأثيراتهم الجانبية قد يزيد بسبب الأسيتامينوفين / الأسبيرين / الكافئين.

- برونيسبيد أو سلفينبيرازون؛ فعاليتها قد تتخفف بسبب الأسيتامينوفين / الأسبيرين / الكافئين.

## الحمل والارضاع:

تداول الأسبيرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل غير منصوح به لأنه قد يسبب أذية للجنين أو مضاعفات خلال الولادة.

وجد سيدري موند في الحليب، يجب على المرضية أن تتناقش مع الطبيب حول المخاطر المحتملة على الطفل إذا كانت المرضية تقوم بالإرضاع أو ستقوم بها.

## فرط الجرعة:

في حال فرط الجرعة، فإن الرعاية الطبية السريعة ضرورية للبالغين وكذلك للأطفال حتى وإن لم يلاحظ المريض أي علامات أو أعراض.

## الجرعة وطريقة الإعطاء:

- البالغون والأطفال ١٢ سنة وما فوق: مضغوظتان كل ٦ ساعات، مع عدم تناول أكثر من ٨ مضغوظات في ٢٤ ساعة.

- الأطفال أقل من ١٢ سنة: حسب وصفة الطبيب.

- يجب أن لا يستخدم المريض المستحضر بجرعة أكبر من الجرعة الموصوفة.

- يجب تناول كأس ممتلئ بماء مع كل جرعة.

## شروط التخزين:

يحفظ في درجة حرارة (٢٠ - ٢٥ °م).

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

## التعبئة:

٢٠ مضغوظة ملبسة بالفيلم معبأة في ظروف بليستر PVDC / أنثيوم ضمن عبوة كرتونية.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يثار على صحتك، واستهلاكه خلافا لتعليمات بعرضك الخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتحصص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء ونقمة وضرم.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

اتحاد الصيدلة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما - ريف دمشق - سوريا