

FURADON

COMPOSITION:

Tablets: Each tablet of Furadon contains 100 mg Furazolidone.

Oral suspension: Each 15 ml of Furadon contains 50 mg Furazolidone.

PROPERTIES:

Furazolidone is an antimicrobial nitrofurans. It has a broad antibacterial spectrum covering the majority of gastrointestinal tract pathogens including *E. coli*, staphylococci, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Aerobacter aerogenes*, *Vibrio cholerae* and *Giardia lamblia*. Its bactericidal activity is based upon its interference with several bacterial enzyme systems; this antimicrobial action minimizes the development of resistant organisms. It neither significantly alters the normal bowel flora nor results in fungal overgrowth. Furazolidone products are well tolerated, have a very low incidence of adverse reactions. And, it can be used with adjunctive therapy with other antibacterial agents or bismuth salts.

INDICATIONS:

Furadone is indicated in the specific and symptomatic treatment of bacterial or protozoal diarrhea and enteritis caused by susceptible organisms.

CONTRAINDICATIONS:

Furadon is contraindicated in patients with prior sensitivity to furazolidone and in infants under 1 month of age.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

Notes:

- The tablet dosage may be crushed and given to children in a spoonful.
- Shake the bottle vigorously prior to administration.

Average Adult Dosage: 100 mg 4 times daily.

Average Dosage for Children: 5 mg/kg/day divided in 4 doses. The maximal dose is 8.8 mg/kg/day.

Age	Dose	Frequency
Adults	1 tablet or Two tablespoonfuls (30 mL)	4 times daily
5 years or Older	¼ to ½ tablet or ½ - 1 tablespoonful (7.5-15.0 ml)	
1- 4 Years	1 - 1½ teaspoonfuls (5.0-7.5 ml)	
1 Month to 1 Year	½ - 1 teaspoonful (2.5-5.0 ml)	

WARNINGS & PRECAUTIONS:

- Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: Patients with G6PD-deficiency may develop mild hemolytic anemia while taking furazolidone
- The safety of furazolidone in lactating women has not been established.
- The safety of furazolidone during pregnancy has not been established (Pregnancy Category C):
- Furazolidone may cause an effective inhibition of monoamine oxidase; which may lead in some patients to hypertension. This has not been observed with the recommended dosage. However, patients should be aware about foods and drugs that enhance the MAO inhibition.
- Consult your doctor if satisfactory clinical response is not obtained within 7 days; he may tell you to discontinue the drug.
- Orthostatic hypotension and hypoglycemia may occur.

SIDE EFFECTS:

Nausea, emesis, headache, or malaise may occur occasionally and may be minimized or eliminated by reduction in dosage or withdrawal of the drug.

A few hypersensitivity reactions to furazolidone have been reported including a fall in blood pressure, urticaria, fever, arthralgia, and a morbilliform rash. These reactions subsided following withdrawal of the drug.

The brown color found in the urine with adequate dosage is of no clinical significance.

DRUG INTERACTIONS:

- Alcohol should be avoided during or within 4 days after furazolidone therapy. Since furazolidone rarely may cause a disulfiram-like reaction to alcohol.
- In general, the drugs that may cause MAO inhibition {including indirectly-acting sympathomimetic amines such as nasal decongestants (phenylephrine, ephedrine) and anorectics (amphetamines) in addition to MAOI drugs} should be avoided or used with caution and at a reduced dosage in patients receiving furazolidone.
- Sedatives, antihistamines, tranquilizers, and narcotics should be used in reduced dosages and with caution, during treatment with furazolidone.

FOOD-DRUG INTERACTIONS:

Tyramine-containing foods such as broad beans, yeast extracts, strong unpasteurized cheeses, alcoholic beverages, pickled herring, chicken livers, and fermented products should be avoided during furazolidone treatment.

STORAGE CONDITIONS:

Store at controlled room temperature: (15°-30°C). Do not refrigerate.

PACKAGE:

Tablets: Carton package contains 20 Tablets.

Oral Suspension: 100 mL amber glass bottle.

Rev. No: 61603

THIS IS A MEDICAMENT
<ul style="list-style-type: none">- The medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
KEEP THE MEDICAMENT OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria

فورادون

التركيب:

مضغوطات: تحتوي كل مضغوظة فورادون على ١٠٠ ملغ فورازوليدون.

معلق قموي: تحتوي كل ١٥ مل من معلق الفورادون على ٥٠ ملغ فورازوليدون.

خواص المستحضر:

الفورازوليدون هو مضاد جرثومي من زمرة النتروفوران. يملك الفورازوليدون طيفاً واسعاً مضاداً للجراثيم يغطي معظم المتعضيات المرضية للجهاز الهضمي، بما فيها: الإشيرشيا الكولونية، المكورات العنقودية، السالمونيلا، الشيغلا، المتقلية، الأيروباكتير أيروجينيس، ضمات الهيضة، والجيارديا لامبيليا. تعتمد فعاليته القاتلة للجراثيم على التداخل مع العديد من الأنظمة الأنزيمية الجرثومية، تقلل هذه الآلية من تطور مقاومة لدى المتعضيات. لا يسبب الدواء تغيرات في الفلورا الطبيعية للأمعاء بشكل ملحوظ كما أنه لا يسبب نمواً إضافياً للفطور. تعتبر مستحضرات الفورازوليدون جيدة التحمل، كما أن آثارها الجانبية قليلة الحدوث جداً، ويمكن استخدامها بالمشاركة مع المضادات الجرثومية الأخرى أو مع أملاح البزموت.

الاستجابات:

يوصف الفورادون كعلاج نوعية وعرضية في حالات التهابات الأمعاء والإسهالات الجرثومية أو الطفيلية الناجمة عن المتعضيات المتحسسة للدواء.

مضادات الاستطباب:

لا يُستخدم الفورادون لدى المرضى الذين سبق لهم وأن أصيبوا بحساسية تجاه الفورازوليدون ولدى الرضع بعمر أصغر من شهر واحد.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

ملاحظات:

- يمكن سحق المضغوظات وإعطائها للطفل بواسطة الملعقة.

- خض العبوة بشكل جيد قبل تناول الدواء.

متوسط جرعة البالغين: ١٠٠ ملغ ٤ مرات في اليوم.

متوسط جرعة الأطفال: ٥ ملغ/كغ / يوم مقسمة على ٤ جرعات. تكون الجرعة العظمى ٨,٨ ملغ/كغ / اليوم.

العمر	الجرعة	التكرار
البالغين	مضغوظة واحدة أو ملعقتي طعام (٣٠ مل)	
٥ سنوات أو أكبر	$\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ مضغوظة أو ١ - $\frac{1}{2}$ ملعقة طعام (٧,٥ - ١٥ مل)	٤ مرات في اليوم
١ - ٤ سنوات	١ - $\frac{1}{4}$ ملعقة شاي (٥ - ٧,٥ مل)	
شهر واحد إلى سنة	$\frac{1}{4}$ - ١ ملعقة شاي (٢,٥ - ٥ مل)	

تحذيرات الاستعمال:

- عوز الفلوكو ٦-٦ فوسفات ديهيدروجيناز: يمكن أن يظهر لدى المرضى المصابين بعوز الـ G6PD فقر دم انحلالي خفيف أثناء تناول الفورازوليدون.

- لم يتم التحقق من أمان الفورازوليدون لدى الأمهات المرضعات.

- لم يتم التحقق من أمان الفورازوليدون خلال الحمل (من أدوية الحمل C).

- يمكن أن يسبب الفورازوليدون تهيئطاً ملحوظاً للمونو أمين أوكسيداز، والذي قد يسبب ارتفاع ضغط لدى بعض المرضى. لم يلاحظ حدوث ذلك عند إعطاء الفورازوليدون بالجرعات الموصوفة. لكن يجب أن يكون المرضى على علم بأنواع الأدوية والأطعمة التي تزيد من تهيئط المونو أمين أوكسيداز.

- استشر الطبيب إذا لم يحدث تحسن سريري كاف خلال ٧ أيام، فقد يخبرك أن توقف الدواء.

- قد يحدث انخفاض ضغط انتصابي ونقص سكر الدم.

التأثيرات الجانبية:

قد يحدث وبشكل نادر غثيان، إقياء، صداع، أو توعك؛ ويمكن أن تزول جميع هذه الأعراض أو تخف بتخفيض الجرعة أو بإيقاف الدواء. لوحظت تفاعلات فرط حساسية قليلة تجاه الفورازوليدون، تشمل هذه التفاعلات: انخفاض في ضغط الدم، شرى، حمى، ألم مفاصل، وطفح يشبه الحصبية. تختفي هذه التفاعلات بعد إيقاف الدواء.

ليس لتلون البول باللون البني الذي يظهر أثناء العلاج أي أهمية سريرية.

التداخلات الدوائية:

- يجب تجنب الكحول خلال المعالجة أو خلال الأيام الأربعة التالية لإيقاف المعالجة، لأن الفورازوليدون يسبب وبشكل نادر تفاعلات مشابهة لتفاعلات الديسولفيرام تجاه الكحول.

- بشكل عام يجب تجنب استعمال الأدوية التي تسبب تهيئط للمونو أمين أوكسيداز (والتي تشمل الأمينات المقلدة للودي بشكل غير مباشر مثل مضادات الاحتقان الأنفية (الفينيل إفرين والإيفيدرين) والأدوية المفقدة للشهية (الأمفيتامين) بالإضافة إلى الأدوية المثبطة للمونو أمين أوكسيداز) عند المرضى الذين يتناولون الفورازوليدون أو أن تستعمل بحذر وجرعات منخفضة.

- يجب أن تستعمل المركبات، مضادات الهيستامين، المهدئات، والمسكنات المركزية بحذر وجرعات منخفضة أثناء العلاج بالفورازوليدون.

التداخلات مع الطعام:

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي التيرامين مثل الفاصوليا العريضة، خلاصة خميرة البيرة، الأجبان غير المسترة القوية، المشروبات الروحية، السردين المخلل، كبد الدجاج، والمنتجات المخمرة أثناء تناول الفورازوليدون.

شروط الحفظ والتخزين:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة: (١٥ - ٣٠ م). لا يوضع في البراد.

التعبئة وشكل العبوة:

مضغوظات: عبوة كرتونية تحوي ٢٠ مضغوظة.

معلق قموي: عبوة زجاجية عاتمة سعة ١٠٠ مل.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

اتحاد الصيدالة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما - ريف دمشق - سوريا