

# MAXIMOND®

## COMPOSITION:

Each 1 mL of MAXIMOND® ophthalmic suspension contains 1 mg of dexamethasone. Preservative: Benzalkonium Chloride 0.01%.

## PROPERTIES:

Dexamethasone is an anti-inflammatory corticosteroid. Dexamethasone has been demonstrated to possess at least 30 times the potency of cortisone.

## INDICATIONS:

MAXIMOND® is indicated for:

1. Treatment of steroid responsive inflammatory conditions of the conjunctiva, cornea and anterior segment of the eye such as: anterior uveitis, iritis, cyclitis, allergic and vernal conjunctivitis, herpes zoster keratitis, superficial punctate keratitis and non-specific superficial keratitis.
2. Treatment of corneal injury from chemical, radiation or thermal burns or following penetration by foreign bodies.
3. Post-operative use to reduce inflammatory reactions and suppress graft reaction.

## CONTRAINDICATIONS:

MAXIMOND® is contraindicated in cases of:

1. Herpes simplex and other viral diseases of the cornea and conjunctiva, fungal disease, ocular tuberculosis, and untreated purulent infections.
2. Hypersensitivity to any component of the preparation.

## DOSAGE & ADMINISTRATION:

### Notes:

- The frequency of instillation of drops and the duration of treatment will vary depending upon the severity of the underlying condition and the response to treatment.
- If you miss a dose: take the next dose when it is due.

### The usual dosage:

- Severe inflammations require one to two drops instilled into the eye every thirty to sixty minutes until a satisfactory response occurs.
- When a favorable response has been observed reduce the dosage towards one drop every four hours.

### How to use the ophthalmic suspension:

1. Sit down in front of a mirror so that you can see what you are doing.
2. Shake the bottle well and then remove the cap from the bottle.
3. Make sure the dropper tip does not touch anything as this may contaminate the contents.
4. Hold the bottle upside down in one hand between your thumb and middle finger.
5. Using the forefinger of your other hand gently pull down the lower eyelid of the affected eye.
6. Place the dropper bottle tip close to, but not touching, your eye and gently tap the base of the bottle with your forefinger so that one or two drops fall into the gap between the eye and the lower lid.
7. Now release the lower eyelid, and blink a few times to make sure the whole of the eye is covered by the liquid.
8. If the drop of medication is not retained in the eye upon dosing for any reason then instill another drop.
9. Repeat steps 5 to 8, above, for the other eye, if necessary.
10. Replace and tightly close the cap on the dropper bottle.

## WARNINGS & PRECAUTIONS:

- This product is for external use only.
- The doctor should perform a periodical check for intraocular pressure and the eye lens, and examination with slit-lamp; if using the ophthalmic suspension for a long period.
- Topical steroids may mask or enhance the activity of acute purulent eye infections.
- Persistent corneal ulceration following long-term topical steroid use may be due to fungal invasion.
- Topical corticosteroids are not effective in mustard gas keratitis or Sjogren's keratoconjunctivitis.
- You must not wear soft contact lenses whilst using this medicine.
- If you got blurred vision following the use of eye suspension you should not drive or operate machinery.

### •Pregnancy and Lactation:

Pregnancy Category C, Topical corticosteroids should be used during pregnancy only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus. Caution should be exercised when topical corticosteroids are administered to a nursing woman.

## SIDE EFFECTS:

Transient stinging or burning may occur on instillation of the drops. Viral and fungal infections may be exacerbated by steroids.

Topical steroid use may result in increased intraocular pressure leading to optic nerve damage, reduced visual acuity and visual field defects.

Intensive or prolonged use of topical corticosteroids may lead to the formation of posterior subcapsular cataracts, and thinning of the cornea or sclera.

## PHARMACOKINETICS:

Intraocular penetration occurs in significant amounts and contributes to the effectiveness of dexamethasone in anterior segment inflammatory disease. Sufficient absorption may occur after topical application to the skin and eye to produce systemic effects.

## OVERDOSAGE & TREATMENT:

If you take too much of this medicine it can be washed out of your eye with warm water. Long-term intensive topical use may lead to systemic effects. Oral ingestion of the contents of the bottle is unlikely to lead to any serious adverse effects.

## STORAGE CONDITIONS:

Store at a temperature not exceeding 25°C in an upright position away from direct sunlight. Do not refrigerate. Keep container tightly closed.

Discard 1 month after opening.

PACKAGE: 5 mL in plastic bottle.

Le 010



Rev. No: 71403

THIS IS A MEDICAMENT
<ul style="list-style-type: none"><li>- The medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.</li><li>- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li></ul>
KEEP THE MEDICAMENT OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

**DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria**

# ماكسي موند

التركيب:

يحتوي كل ١ مل من معلق الماكسي موند العيني على ١ ملغ من الديكساميثازون.  
المادة الحافظة: بنز الكوتيوم كلورايد ٠,٠١٪.

خواص المستحضر:

يعتبر الديكساميثازون مضاد التهاب ستيروئيدي قشري.

إن فعالية الديكساميثازون أكثر بثلاثين ضعف على الأقل من فعالية الكورتيزون.

الاستطيات:

يُستخدم الماكسي موند في الحالات التالية:

١. لمعالجة الحالات الالتهابية المستجيبة للستيروئيدات التي تصيب الملتحمة، القرنية، الجزء الأمامي من العين مثل: التهاب العنابية الأمامي، التهاب القرزحية، التهاب الجسم الهدبي، التهاب الملتحمة التحسسي والتهاب الملتحمة الربيعي، التهاب القرنية الحثلي، التهاب القرنية السطحي المرقط، التهاب القرنية السطحي اللانوعي.
٢. لمعالجة أذية القرنية الناجمة عن الحروق الكيميائية، الإشعاعية أو الحرورية أو دخول أجسام غريبة في العين.
٣. بعد العمليات الجراحية لإنقاذ الارتكاسات الالتهابية ولكبح ارتكاسات التطعيم.

مضادات الاستطيات:

لا يُستخدم الماكسي موند في حالات الإصابة بالأمراض التالية:

١. الحلا البسيط والأمراض الفيروسية الأخرى التي تصيب القرنية والملتحمة، الأمراض الفطرية، التدرن السلي العيني، والإنانات الفيحية غير المعالجة.
٢. فرط الحساسية لأي مكون من مكونات المستحضر.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

ملاحظات:

• يتفاوت عدد مرات التطهير وفترة العلاج تبعاً لشدة الحالة والاستجابة العلاجية.

• في حال نسيان جرعة: طبق الجرعة التي تليها في وقتها.

الجرعات الاعتيادية:

• تتطلب الالتهابات الحادة نقطة واحدة أو اثنتين في العين كل ٣٠ أو ٦٠ دقيقة حتى الحصول على استجابة مرضية.

• عندما تلاحظ استجابة مناسبة للدواء تُقل الجرعة المأخوذة حتى تصبح نقطة واحدة كل أربع ساعات.

كيف تستخدم المعلق العيني؟

١. اجلس أمام مرآة أو ما شابه بحيث تستطيع رؤية ما تفعله.

٢. خض العبوة بشكل جيد، ثم انزع الغطاء عنها.

٣. تأكد من عدم ملامسة رأس القطارة لأي شيء وذلك قد يلوث محتواها.

٤. أمسك العبوة بالمقلوب بيد واحدة بين إبهامك والإصبع الوسطى.

٥. باستخدام سبابة اليد الأخرى أنزل برق الجفن السفلي للعين المصابة.

٦. هزّب القطارة من العين دون ملامستها، انظر بلطف على قاعدة العبوة بسبابتك بحيث تنزل قطرة واحدة أو اثنتين في الفراغ بين العين والجفن السفلي.

٧. اترك الآن الجفن السفلي وارمش عينك عدة مرات لتأكد من أن السائل قد غطى كل العين.

٨. إن لم تصل نقطة الدواء إلى العين لأي سبب من الأسباب اقلر قطرة أخرى.

٩. أعد الخطوات من ٥ إلى ٨ المذكورة أعلاه للعين الأخرى إن اقتضت الحاجة.

١٠. أعد الغطاء وأحكام إغلاق عبوة القطارة.

تحذيرات الاستعمال:

• هذا المنتج مُعد للاستعمال الخارجي فقط.

• في حال استعمال هذا المعلق العيني لفترة زمنية طويلة يجب على الطبيب إجراء فحص دوري لضغط مقلة العين وعدسة العين، وإجراء اختبار بالمصباح الشقي.

• من الممكن أن تُتَعَب الستيروئيدات الموضعية أو تعزز من نشاط التهابات العين المتبقية الحادة.

• قد يكون تفرح القرنية المستمر التالي لاستخدام الستيروئيدات الموضعية لفترة زمنية طويلة ناجماً عن إصابة فطرية.

• ليس للستيروئيدات القشرية أي تأثير على التهاب القرنية الناتج عن غاز الخردل أو التهاب القرنية والملتحمة لشوغرن Sjogren's keratoconjunctivitis .

• تجنب استعمال عدسات لاصقة مرنة أثناء استعمال هذا المستحضر.

• إن شعرت باضطراب في الرؤية بعد استعمال هذا المعلق العيني يجب ألا تقود السيارة أو تشغيل آلة.

الحمل والإرضاع:

يُصنّف الماكسي موند من أدوية الحمل C، يسمح باستخدام الستيروئيدات القشرية الموضعية خلال فترة الحمل فقط إذا كانت الفائدة المرجوة

تتوق الخطر المتوقع على الجنين.

يجب الحذر عندما تعطى الستيروئيدات القشرية الموضعية للمرأة المرضع.

التأثيرات الجانبية:

يمكن الشعور بحس لسع أو حرقة عابر نتيجة استخدام الدواء. ومن المحتمل أن يتفاقم الخمج الفيروسي والفتري بعد استعمال الستيروئيدات. قد يسبب استخدام الستيروئيدات الموضعية ارتفاعاً في ضغط مقلة العين مما يحدث أذية في العصب البصري، ضعف في حدة الرؤية و اضطراب في الساحة البصرية.

قد يؤدي استخدام الستيروئيدات القشرية الموضعية بجرعات كبيرة أو لمدة طويلة إلى تشكيل ساد تحت محفظة خلفية وترقق في القرنية أو في الصلبة.

الحركية الدوائية:

تدخل كميات هامة إلى مقلة العين حيث تساهم في فعالية الديكساميثازون تجاه الإصابات الالتهابية للجزء الأمامي من العين، من الممكن أن يحدث امتصاص كاف بعد التطبيق الموضعي على الجلد والعين لإحداث آثار جهازية.

تأثير زيادة الجرعة ومعالجتها:

في حال تطبيق كميات زائدة من هذا الدواء بإمكانك غسل العين بالماء الدافئ.

قد يؤدي الاستخدام الموضعي بجرعات عالية ولفترة طويلة إلى آثار جهازية، من غير المحتمل أن يؤدي التناول الفموي لمحتوى العبوة إلى أية آثار مرضية خطيرة.

شروط الحفظ والتخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز ٢٥°م، بشكل شاقولي بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. لا توضع في البراد، أغلق العبوة.

تخلص من العبوة بعد مرور شهر من فتح العبوة.

التعبئة وشكل العبوة: عبوة بلاستيكية سعة ٥ مل.

إن هذا الدواء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

اتحاد الصيدالة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما - ريف دمشق - سوريا