

# PHENZOLINE

## DESCRIPTION:

Phenzoline (Naphazoline Hydrochloride, Pheniramine Maleate) is a combination of an antihistamine and a decongestant prepared as sterile topical ophthalmic solution.



## COMPOSITION:

Each mL contains:

Active: Naphazoline Hydrochloride 0.025 %, Pheniramine Maleate 0.3 %.  
Preservative: Benzalkonium chloride 0.01 %. Inactives and purified water.

## CLINICAL PHARMACOLOGY:

Phenzoline combines the effects of the antihistamine, pheniramine maleate, and the decongestant, naphazoline.

## INDICATIONS AND USAGE:

For relief of ocular irritation and / or congestion or for the treatment of allergic or inflammatory ocular conditions.

## CONTRAINDICATIONS:

Hypersensitivity to one or more of the components of this preparation.

## WARNINGS:

Do not use in the presence of narrow angle glaucoma. Patients under MAO inhibitors may experience a severe hypertensive crisis if given a sympathomimetic drug.

Use in infants and children may result in CNS depression leading to coma and marked reduction in body temperature.

## PRECAUTIONS:

This preparation should be used with caution in elderly patients with severe cardiovascular disease including cardiac arrhythmias; patients with poorly controlled hypertension; patients with diabetes, especially those with a tendency toward diabetic ketoacidosis. To prevent contaminating the dropper tip and solution, care should be taken not to touch the eyelids or surrounding area with dropper tip of the bottle.

## ADVERSE REACTIONS:

The following adverse reactions may occur: pupillary dilation, increase in intraocular pressure, systemic effects due to absorption (i.e., hypertension, cardiac irregularities, hyperglycemia).

## DOSAGE AND ADMINISTRATION:

One or two drops instilled in each eye every 3 to 4 hours or less frequently, as required to relieve symptoms.

## STORAGE:

Store at room temperature (15° - 25°C). Keep bottle tightly closed when not in use. Protect from light and excessive heat. Keep out of the reach of children. Discard one month after opening.

## HOW SUPPLIED:

10 mL plastic bottle.

Rev. No: 81705

THIS IS A MEDICAMENT
<ul style="list-style-type: none"><li>- The medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.</li><li>- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li></ul>
KEEP THE MEDICAMENT OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

**DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria**

# فينزولين

## وصف المستحضر:

الفينزولين (نافازولين هيدروكلورايد، فينيرامين مالمات) عبارة عن مشاركة لمضاد هيستامين ومضاد احتقان، معد على شكل قطرة عينية موضعية عقيمة.

## التركيب:

يحتوي كل ١ مل على:

مواد فعالة: نافازولين هيدروكلورايد ٠,٠٢٥ ٪، فينيرامين مالمات ٠,٣ ٪.

مادة حافظة: بنز الكونيوم كلورايد ٠,٠١ ٪. سواغات وماء نقي.

## التأثير الدوائي:

يُشارك الفينزولين بين تأثيرات مضاد الهيستامين (الفينيرامين مالمات) ومضاد الاحتقان (النافازولين).

## الاستجابات:

لتخفيف التهيج و/أو الاحتقان العيني أو لمعالجة الحالات التحسسية أو الالتهابية في العين.

## مضادات الاستطباب:

فرط التحسس تجاه مكون أو أكثر من مكونات المستحضر.

## التحذيرات:

لا تستعمل الدواء في حال الإصابة بالزرق ضيق الزاوية. قد يعاني المرضى المعالجين بمشيطات المونوأمين أو أكسيداز من أزمة ارتفاع ضغط دم شديد عند إعطائهم مقلدات الودي.

يؤدي استعمال الدواء لدى الرضع والأطفال إلى تثبيط للجملعة العصبية المركزية قد يصل إلى سبات وانخفاض ملحوظ في درجة حرارة الجسم.

## الاحتياطات:

يستعمل هذا المستحضر بحذر لدى المرضى المسنين المصابين بأمراض قلبية شديدة، بما فيها اضطرابات نظم القلب؛ المصابين بارتفاع في ضغط الدم غير المعالج بشكل جيد؛ المصابين بالداء السكري، وخصوصاً الذين لديهم استعداد للإصابة بحُمّاض خلوني سكري. لمنع تلوث رأس القطارة والمحلول، يجب الحذر من تماس الأجزاء أو الأنسجة المحيطة مع رأس قطارة العبوة.

## التأثيرات الجانبية:

قد تحدث التأثيرات الجانبية التالية: توسع الحدقة، ارتفاع ضغط باطن العين، تأثيرات جهازية ناجمة عن امتصاص الدواء (مثل: ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات نظم القلب، ارتفاع سكر الدم).

## الجرعة وطريقة الاستعمال:

١ أو ٢ نقطة تقطر في كل عين كل ٣ - ٤ ساعات، أو بتكرار أقل، تبعاً لما يتطلبه تحسن الأعراض.

## شروط الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥° - ٢٥° م). أبقِ العبوة مغلقة بإحكام عند عدم استعمالها. يحفظ بعيداً عن الضوء والحرارة المرتفعة. يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. تخلص من العبوة بعد مرور شهر على فتحها.

## التعبئة:

عبوة بلاستيكية سعة ١٠ مل.

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه وضره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

اتحاد الصيدلة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما - ريف دمشق - سوريا