

# Relispa

**COMPOSITION:**

Each tablet contains 40, 80 mg of Drotaverine Hydrochloride.

**Excipients:** Magnesium stearate, Talc, Povidone, Corn starch, Lactose monohydrate.

**MECHANISM OF ACTION:**

Drotaverine has antispasmodic effect mediated via inhibition of phosphodiesterase IV, specific for smooth muscle. It has a rapid and direct action on the smooth muscle. It acts to correct cyclic AMP and Ca imbalance at the spastic site, thereby relieving smooth muscle spasm and pain.

**PHARMACOKINETICS:**

Rapid and total absorption by gastrointestinal tract. Bioavailability is about 100%. Half absorption is 12 min. Smooth distribution in tissues of plain muscle cells. Drotaverine is bound with plasma proteins to 95-98%.

**INDICATIONS :**

As an antispasmodic .

**CONTRAINDICATIONS:**

Severe renal/hepatic/cardiac dysfunction. Porphyria. Hypersensitivity, glaucoma.

**DOSAGE:**

**Adult:** 40-80 mg tid.

**Child:**

**1- 6 yr:** 20 mg 3- 4 times daily;

**>6 yr:** 40 mg tid

May be taken with or without food.

**ADVERSE REACTIONS :**

Vertigo, nausea, vomiting, dry mouth.

**DRUG INTERACTIONS :**

May attenuate the action of levodopa. Additive beneficial effect with concurrent use of analgesics ,antimuscarinics or benzodiazepines.

**PRECAUTIONS:**

Exercise caution in patients with renal/hepatic/cardiac dysfunction. Pregnancy, and lactation.

**STORAGE CONDITION :**

Store in original container at temperature not exceeding 25°C.

**PACKAGE :**

20 tablets in a blister of PVC-aluminum in a carton box.

| THIS IS A MEDICAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- The medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instruction is dangerous for you.</li><li>- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.</li><li>- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.</li><li>- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.</li></ul> |
| KEEP THE MEDICAMENT OUT OF THE REACH OF CHILDREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Council of Arab Health Ministers

Arab Pharmacists Association

**DIAMOND PHARMA – Damascus suburb – Syria**

# ريليسبا

## التركيب:

حتوي كل مضغوطة على ٤٠، ٨٠ ملغ من دروتافيرين هيدروكلوريد.  
**السواغات:** شمععات المغنزيوم ، تالك ، يوفيدون ، نشاء الذرة ، اللاكتوز مونوهيدرات.

## آلية التأثير :

يمتلك دروتافيرين تأثير مضاد للتشنج عبر تثبيط فوسفودي أستيرازIV،خديدا العضلات الملساء ويمتلك أيضا تأثير مباشر وسريع على العضلات الملساء.وهو يعمل على تصحيح AMP الحلقي والكالسيوم الغير متوازن في مكان التشنج وبالتالي تخفيف تشنجات العضلات الملساء والألم.

## الحركة الدوائية:

له امتصاص سريع وكلي عبر السبيل المعدي المعوي،التوافر الحيوي حوالي ١٠٠٪.الامتصاص النصفى ١٢ دقيقة.يتوزع بشكل خفيف في الأنسجة وخلايا العضلات البسيطة. يرتبط دروتافيرين ببروتينات البلازما بنسبة ٩٥-٩٨٪.

## الاستطبابات:

كمضاد تشنج.

## مضادات الاستطباب :

خلل وظيفي شديد كلوي/كبدى/قلبي،البورفيريا،فرط حساسية،الزرق.

## الجرعة :

**البالغين:** ٤٠-٨٠ ملغ ثلاث مرات في اليوم.

## الأطفال:

من ١ إلى ٦ سنوات: ٢٠ ملغ ٣-٤ مرات في اليوم.

أكثر من ٦ سنوات: ٤٠ ملغ ثلاث مرات في اليوم.

يمكن أن تأخذ مع أو بدون طعام.

## الآثار الجانبية :

دوار،غثيان، إقياء، جفاف الفم.

## التداخلات الدوائية :

من الممكن أن يضعف تأثير الليفودوبا.له تأثيرات إضافية مفيدة بالاستخدام المتزامن مع مسكنات الألم،مضادات المسكارينات أو البنزوديازيبينات.

## الاحتياطات :

ممارسة الحذر عند المرضى اللذين لديهم خلل وظيفي كلوي/كبدى/قلبي.الحمل والإرضاع.

## شروط الحفظ:

يحفظ في عبوته الأصلية عند درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

## التعبئة :

٢٠ مضغوطة في بليستر من الألنيوم/PVC في عبوة كرتونية.

| إن هذا الدواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.</li><li>- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.</li><li>- فالطبيب والصيدلاني هما الجبران بالدواء ونفعه وضره.</li><li>- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.</li><li>- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.</li></ul> |
| لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

اتحاد الصيادلة العرب

مجلس وزراء الصحة العرب

شركة دياموند فارما – ريف دمشق – سوريا